

Liebe Patientin
Lieber Patient

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen.
Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Imazol[®] Creme plus

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

1 g Creme enthält: Clotrimazol 10 mg, Hexamidindiisetionat 2,5 mg

Sonstige Bestandteile:

Octyldodecanol, gereinigtes Wasser, Dimeticon, Mono- und Diglyceride der Palmitin- und Stearinsäure, PEG-5-stearylstearat, Macrogolstearylether.

Darreichungsform und Inhalt

Creme, Tube mit 25g

Antipilzmittel (Antimykotikum)

Hersteller:

Spirig Pharma AG CH-4622 Egerkingen

Pharmazeutischer

Vertriebsunternehmer:

☞ Hans Karrer GmbH 86330 Königsbrunn

Anwendungsgebiete

Imazol Creme plus wird bei Pilzinfektionen (Mykosen) der Haut angewendet.

Erläuterungen:

Pilzinfektionen (= Mykosen) entstehen bei übermässiger Vermehrung von Pilzen, die immer auf der Haut nachweisbar sind. Die Haut reagiert dabei mit Brennen, Juckreiz, Abschuppung und schmerzhafter Entzündung. Eine sichere Erkennung von Pilzerkrankungen ist nur durch einen Arzt möglich.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Imazol Creme plus nicht anwenden?

Bei Überempfindlichkeit auf Clotrimazol, Hexamidindiisetionat und damit verwandten Amidinen.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Clotrimazol sollte aus Vorsicht nicht in der Frühschwangerschaft angewendet werden. Im 2. und 3. Drittel der Schwangerschaft sowie in der Stillzeit kann Imazol Creme plus auf ausdrückliche Anweisung des Arztes angewendet werden.

Um direkten Kontakt des Säuglings mit Clotrimazol zu vermeiden, sollte Imazol Creme plus von Stillenden nicht im Brustbereich angewendet werden.

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu beachten?

Besondere Anpassungen sind nicht notwendig, da bei Anwendung von Imazol Creme plus keine vermehrten oder verstärkten Nebenwirkungen bekannt geworden sind.

Wechselwirkungen

Welche Arzneimittel beeinflussen sich in der Wirkung?

Imazol Creme plus vermindert die Wirksamkeit von Amphotericin und anderen Polyenantibiotika (Nystatin, Natamycin). Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für vor kurzem angewandte Arzneimittel gelten können.

Welche Kosmetika sollten Sie meiden?

Auf den erkrankten Hautstellen sollten Sie Deodorantien oder andere Kosmetika nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden, da eine Minderung der Wirksamkeit von Imazol Creme plus nicht ausgeschlossen werden kann.

Warnhinweise

Imazol Creme plus darf auf der Glans Penis (Eichel) nicht angewendet werden. Imazol Creme plus sollte im Bereich der Augen nicht verwendet werden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Imazol Creme plus nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Imazol Creme plus sonst nicht richtig wirken kann.

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Imazol Creme plus anwenden?

Die erkrankten Hautstellen werden zweimal täglich, morgens und abends, mit Imazol Creme plus eingerieben. Für eine etwa handtellergrosse Fläche ist ein ca. 0,5 cm langer Cremestrang ausreichend.

Wie und wann sollten Sie Imazol Creme plus anwenden?

Zum Auftragen auf die Haut.

Imazol Creme plus sollte dünn und geringfügig über die Randbezirke hinaus auf die erkrankten Hautstellen aufgetragen werden.

Wie lange sollten Sie Imazol Creme plus anwenden?

Entscheidend für den Behandlungserfolg ist, dass die Behandlung regelmässig und ausreichend lange durchgeführt wird. Nach Abklingen der entzündlichen Reaktionen sowie der subjektiven Beschwerden sollte das Präparat nicht sofort abgesetzt werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Imazol Creme plus auftreten?

In sehr seltenen Fällen kann es zu Reizerscheinungen, z.B. Brennen oder Stechen, kommen. Bei Überempfindlichkeit auf einen der Wirkstoffe oder die Hilfsstoffe können allergische Reaktionen auftreten. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweis und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfalldatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Tubenfalz aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nach Ablauf dieses Datums nicht mehr.

Arzneimittel sollten grundsätzlich für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Stand der Information

Oktober 2005

Ergänzende Informationen

Die Kombination der beiden Wirkstoffe Clotrimazol und Hexamidindiisetionat erweitert das Spektrum der klassischen Antimykotika. Imazol Creme plus wirkt deshalb gegen eine Vielzahl verschiedenartiger Pilze wie Fadenpilze, Hefe- und Schimmelpilze, aber auch gegen wichtige krankmachende Bakterien, z.B. Staphylokokken und Pseudomonaden. Diese Erweiterung des Wirkungsspektrums ist deshalb von Bedeutung, weil gewisse Pilzerkrankungen der Haut, z.B. Fusspilzformen, speziell in den Zehenzwischenräumen, Mischinfektionen durch Pilze und Bakterien darstellen. Mit Imazol Creme plus werden auch hier mögliche Erreger abgedeckt, was bei herkömmlichen Antipilzmitteln oft nicht der Fall ist.

Die Behandlung dauert in der Regel bei Hefeinfektionen ca. 2 Wochen, bei tiefsitzenden Fadenpilzen 2 bis 4 Wochen. Ein zu frühes Absetzen der Behandlung kann zu einem Wiederaufflammen der Erkrankung führen.